

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

Normanda

Tamaño: Medio y grande.

Forma: Variada, cilíndrica o tronco-cónica, estos últimos más voluminosos hacia la base. Contorno irregular, a veces rebajado de un lado en la cima.

Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia y profunda en la mayoría. Bordes irregulares. Fondo con iniciada ruginosidad o bien exento de ella. **Pedúnculo:** Corto, no llegando hasta el borde de la cavidad y raramente sobrepasándolo.

Cavidad del ojo: Medianamente estrecha, profunda o poco profunda, con bordes suavemente ondulados y rebajado notablemente de un lado en algún fruto. Fondo tomentoso. **Ojo:** Cerrado, entreabierto y aisladamente aparece alguno abierto. Sépalos muy compactos en su base o levemente agrietados, puntiagudos y vueltos hacia fuera.

Piel: De notable a inapreciable untuosidad, fuerte y brillante. **Color:** Verdoso. Chapa ausente o de tono rosa cobrizo pero, en ambos casos, acusa pinceladas de rosa mas o menos intenso que se reparten a lo largo del fruto.

Tubo del cáliz: Triangular o alargado, estambres situados casi siempre en la parte media.

Corazón: Bulbiforme alargado o ausencia de las líneas que lo enmarcan. Eje agrietado o hueco. Celdas de forma variada pero con tendencia a alargada, cartilaginosas, lisas o rayadas de lanosidad blanca.

Semillas: Alargadas y variadas de tamaño.

Carne: Blanca a verdosa y presentando a veces zonas como heladas. Dura, crujiente, jugosa. **Sabor:** Característico de la variedad. Agradable.

Maduración: Invierno.

